

検査内容変更のお知らせ

謹啓 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
 この度、下記検査項目の検査内容を変更させて頂きたくご案内いたします。
 何卒ご高承賜りますようよろしくお願い申し上げます。

敬白


記

- 実施日 : 平成 29年 1月 5日 (木) ご依頼分より
- 変更項目 : プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド (P-Ⅲ-P)
 尿中NMP 22 定量
 血小板第4因子 (PF-4)
 β-トロンボグロブリン (β-TG)
- 変更内容 :

項目コード	検査項目 (グループコード)	変更内容	新	現	備考	検査案内書 掲載ページ
126	プロコラーゲン-Ⅲ-ペ プチド(P-Ⅲ-P) (4059)	検体必要量	血清 0.5mL	血清 0.3mL	委託先による変更。(Non- RIA試薬への変更) 本変更に伴い、基準値、報 告上下限值等が変更となり ます。なお、基準値は文献 値です。 カットオフ値(肝に線維化の みられる疾患): 6.95ng/mL	1
		検査方法	CLIA法	RIA法		
		基準値	3.62~9.52 (ng/mL)	0.3~0.8 (U/mL)		
		報告上限	99900000 (ng/mL)	99000000 (U/mL)		
		報告下限	0.50未満 (ng/mL)	0.10以下 (U/mL)		
2706	尿中NMP22定量 (4764)	所要日数	4~6日	5~7日	委託先による変更。 その他の検査内容に変更は ございません。	46
462	血小板第4因子 (PF-4) (2413)		4~8日	4~6日		106
464	β-トロンボグロブリン (β-TG) (2412)		4~8日	4~6日		

◆ 現試薬と新試薬の比較（プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド）

※ 検査方法・単位等が異なるため相関性はありませんのでご注意ください。



▼ 参考文献

北原 志穂, 他 : 医学と薬学 72 (9) : 1579-1590, 2015. (プロコラーゲン-Ⅲ-ペプチド)